



**XXXIX OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY
TURNIEJ
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY PTTK
Finał Centralny
GDAŃSK 9 - 12 CZERWCA 2011 R.**



**Samarytanka
Szkoły podstawowe**

/10

Imię i Nazwisko	
Województwo	

W KAŻDYM PYTANIU TYLKO 1 ODPOWIEŹ JEST PRAWIDŁOWA

- Osobę we wstrząsie zabezpieczamy przed wychłodzeniem folią „życia”, należy ją ułożyć:
 - złotą stroną na zewnątrz.
 - srebrną stroną na zewnątrz.
 - kolor nie ma znaczenia, gdyż ma na celu ułatwić zauważenie uszkodzonego
 - najważniejsze jest okrycie uszkodzonego folią
- Hipoglikemia to stan:
 - odpowiadania tylko na zadawane pytania
 - charakteryzujący się niskim poziomem glukozy we krwi (znacznie poniżej normy)
 - charakteryzujący się objawami podobnymi jak we wstrząsie
 - prawidłowe są odpowiedzi A,B,C
- Do często spotykanych objawów zawału m. sercowego należą:
 - piekący ból w kl. piersiowej
 - drętwienie lewej kończyny górnej
 - uczucie lęku i osłabienia.
 - prawdziwe A,B,C
- Jednym z pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla jest/są:
 - bóle brzucha
 - drapanie w gardle
 - skoki temperatury
 - zawroty głowy
- Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?
 - uraz kręgosłupa szyjnego
 - zaburzenia rytmu serca
 - wstrząs hipowolemiczny
 - wszystkie prawdziwe
- Brak czucia bólu stwierdzisz przy oparzeniu:
 - I stopnia
 - II stopnia
 - III stopnia
 - wszystkich wymienionych
- Dziecko w trakcie zabawy w ogrodzie zostało ukąszone wielokrotnie przez pszczoły. Należy natychmiast:
 - przenieść dziecko w miejsce bezpieczne, w miarę możliwości usunąć pozostałe żądła i zrobić ciepłe okłady
 - przenieść dziecko w miejsce bezpieczne i wezwać pomoc
 - przenieść dziecko w miejsce bezpieczne, w miarę możliwości usunąć pozostałe żądła i zrobić zimne okłady
 - prawdziwe są odpowiedzi B,C
- W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u uszkodzonego:
 - 1) zaburzeń świadomości;
 - 2) przyspieszonego tętna;
 - 3) zaczerwienienia skóry;
 - 4) pobudzenia ruchowego

a) 1,2,3 b) 1,3 c) 1,2. d) 1,4.
- W krwotoku tętnicznym przedramienia, który nie zmniejsza się po rutynowym zaopatrzeniu opatrunkiem uciskowym, należy rozważyć następujące postępowanie:
 - umieszczenie kończyny powyżej poziomu serca;
 - wzmocnienie ucisku poprzez owinięcie opatrunku dodatkowym i zwojami bandaża;
 - znięcie już założonego opatrunku i ponowne założenie grubszego opatrunku;
 - założenie opaski zaciskowej na przedramieniu;
 - wzmocnienie opatrunku poprzez dodanie twardego przedmiotu np. telefon komórkowy, butelka itp.

Prawidłowa odpowiedź to:
a) 1,3. b) 1,2,4. c) 1,2,5 d) 1,3,4.
- Najdogodniejszą pozycją dla uszkodzonych po urazie brzucha jest pozycja:
 - półsiedząca
 - leżąca z nogami zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych
 - boczna ustalona
 - leżąca na brzuchu, z nogami wyprostowanymi